

Conectados a ti

**Anestesia Inibsa, 50 años
ayudándote a crear sonrisas
sin dolor**

Control del dolor
Sinónimo de experiencia



Anestesia Inibsa: dinámica, cercana y adaptada a ti



Toda la información de un vistazo.

Nuestras cajas tienen una estructura inteligente para encontrar la información que necesitas de forma fácil y rápida.

Imagen con punteado y curva.

La forma de Inibsa traza una curva que transmite nuestro deseo de acompañarte y ayudarte en todo lo que necesites para que tus pacientes sonrían sin dolor.



Comprometidos con nuestros valores:

Experiencia y fiabilidad

Más de 50 años vinculados a la fabricación y comercialización de anestesia dental.

Seguridad


El émbolo y el diafragma de nuestros cartuchos dentales se fabrican sin látex para reducir el riesgo de reacciones alérgicas.

Resistencia

Cartucho de vidrio de borosilicato neutro de tipo I resistente a la hidrólisis.

Sostenibilidad

Blíster 100% reciclable.



Optimiza tus tratamientos de mayor duración.

ARTINIBSA 40 mg/ml + 10 microgramos/ml solución inyectable

Potente anestésico local con tiempo de latencia corto indicado en intervenciones complejas o que requieren una isquemia acentuada.¹

La elevada liposolubilidad de la articaína, confiere una mejor difusión a través de los tejidos blandos y óseos resultando muy efectivo en técnicas infiltrativas.¹

Duración^{1,2}

Tiempo de latencia

Anestesia pulpar

Tejidos blandos

~2 min

60 / 75 min

180 / 360 min

Dosis máxima recomendada*
Adulto sano 70 kg, 7 cartuchos



Optimiza tus tratamientos de duración intermedia.

ARTINIBSA 40 mg/ml + 5 microgramos/ml solución inyectable

Potente anestésico local con tiempo de latencia corto indicado en intervenciones de duración intermedia o en pacientes que no toleran dosis normales de vasoconstrictor.¹

La elevada liposolubilidad de la articaína, confiere una mejor difusión a través de los tejidos blandos y óseos resultando muy efectivo en técnicas infiltrativas.¹

Duración^{1,2}

Tiempo de latencia

Anestesia pulpar

Tejidos blandos

~2 min

45 / 60 min

120 / 300 min

Dosis máxima recomendada*
Adulto sano 70 kg, 7 cartuchos



La anestesia dental de referencia y más versátil.

XILONIBSA 20 mg/ml + 0,0125 mg/ml solución inyectable

Anestésico local que posee la mayor experiencia clínica y proporciona la suficiente anestesia pulpar profunda que requieren la mayoría de los tratamientos dentales.¹

Es el único anestésico que tiene el reconocimiento de seguridad de tipo B para su uso en embarazadas.^{1**}

Duración¹

Tiempo de latencia

Anestesia pulpar

Tejidos blandos

3 / 5 min

60 min

180 / 300 min

Dosis máxima recomendada*
Adulto sano 70 kg, 8.8 cartuchos



Acción prolongada y control de dolor postoperatorio.

INIBSACAIN 5 mg/ml + 0.005 mg/ml solución inyectable en cartucho

Anestésico local muy potente indicado en intervenciones en las que se necesita una anestesia profunda de más de 90 minutos o control del dolor postoperatorio como en cirugías implantológicas, periodontales o endodoncias.¹

Posee un efecto analgésico residual.¹

Duración¹

Tiempo de latencia

Anestesia pulpar

Tejidos blandos

6 / 10 min

90 / 180 min

240 / 540 min

Dosis máxima recomendada*
Adulto sano 70 kg, 10 cartuchos



Ideal para tratamientos de duración media.

SCANDINIBSA 20 mg/ml + 10 microgramos/ml solución inyectable

Anestésico local de escasa actividad vasodilatadora indicado en procedimientos odontológicos de duración media o en aquellos pacientes en los que se recomienda una baja concentración anestésica a nivel plasmático.¹

Se obtiene efecto anestésico con mínimas dosis de anestesia y vasoconstrictor.¹

Duración¹

Tiempo de latencia

Anestesia pulpar

Tejidos blandos

2 / 3 min

60 min

180 / 300 min

Dosis máxima recomendada*
Adulto sano 70 kg, 5.5 cartuchos
Niño sano 20 kg, 1.5 cartuchos



La opción sin vasoconstrictor para pacientes de riesgo.

SCANDINIBSA 30 mg/ml solución inyectable

Anestésico local sin vasoconstrictor indicado en procedimientos odontológicos de corta duración o en pacientes de riesgo como cardiopatas, diabéticos, con hipertiroidismo o geriátricos.¹

Al no contener vasoconstrictor, su escaso poder de vasodilatación lo hace menos tóxico.¹

Duración^{1,3}

Tiempo de latencia

Anestesia pulpar

Tejidos blandos

3 / 5 min

25 min infiltración maxilar / 40 min BNAI

90 min infiltración maxilar / 165 min BNAI

Dosis máxima recomendada³
Adulto sano 70 kg, 5.5 cartuchos
Niño sano 20 kg, 1.1 cartuchos




Bibliografía

- * La dosis máxima recomendada (DMR) de una solución anestésica que contiene un anestésico local y un vasoconstrictor, depende de cuál de los dos principios activos llega antes a su DMR.¹
- ** Aunque no hay evidencia de afectación del feto en los estudios realizados en animales, no debería utilizarse durante el embarazo excepto si fuese claramente necesario.
- 1. Malamed, S.F. Handbook of Local Anesthesia. 7th. ed.- St. Louis, MI : Elsevier Mosby, 2020. p. 64-75.
- 2. Daskalos, D. Local anaesthesia for the Dental Hygienist. 1st. ed.- St. Louis, MI : Elsevier Mosby, 2012. p. 129-130.
- 3. Resumen de las características del producto: ARTINIBSA 40 mg/ml + 10 microgramos/ml solución inyectable, ARTINIBSA 40 mg/ml + 5 microgramos/ml solución inyectable, XILONIBSA 20 mg/ml + 0,0125 mg/ml solución inyectable, SCANDINIBSA 20 mg/ml + 10 microgramos/ml solución inyectable, SCANDINIBSA 30 mg/ml solución inyectable, INIBSACAIN 5 mg/ml + 0.005 mg/ml solución inyectable en cartucho.

Fichas técnicas

 **ARTINIBSA 40 mg/ml + 10 microgramos/ml solución inyectable**

 **ARTINIBSA 40 mg/ml + 5 microgramos/ml solución inyectable**

 **XILONIBSA 20 mg/ml + 0,0125 mg/ml solución inyectable**

 **INIBSACAIN 5 mg/ml + 0.005 mg/ml solución inyectable en cartucho**

 **SCANDINIBSA 20 mg/ml + 10 microgramos/ml solución inyectable**

 **SCANDINIBSA 30 mg/ml solución inyectable**

Distribuido por: **Inibsa Dental, S.L.U.** Ctra. Sabadell a Granollers, Km. 14,5 - 08185 Lliçà de Vall, Barcelona (España). T +34 938 609 500 | F +34 938 439 695

Fabricado por: **Laboratorios Inibsa S. A.** Ctra. Sabadell a Granollers, Km. 14,5 - 08185 Lliçà de Vall, Barcelona (España).

Contacta con nosotros: **900 052 240** | www.inibsadental.com | dental@inibsa.com

Síguenos en:

